DOI 10.31718/2077-1096.19.4.8

УДК:616.3-008.5-02-092-091-053.31

Волосівська Ю. М., Годованець О. С.

КЛІНІКО-ПАРАКЛІНІЧНІ АСПЕКТИ ПРОГНОЗУВАННЯ ВАЖКИХ ФОРМ ГІПЕРБІЛІРУБІНЕМІЇ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ

Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Сучасні клінічні настанови в неонатології містять перелік груп ризику новонароджених щодо тяжких форм неонатальної жовтяниці, проте бракує достовірності клініко-параклінічних критеріїв, які б дозволили прогнозувати важкість перебігу патології, а також, визначити предиктори та ранні ознаки дисфункції гепатобіліарної системи для проведення своєчасної медикаментозної корекції в неонатальному періоді. Мета дослідження. Провести аналіз факторів ризику соматичної патології, перебігу вагітності та пологів у матері, клініко-параклінічних особливостей ранньої неонатальної адаптації у дітей з урахуванням гестаційного віку при народженні для виявлення груп ризику новонароджених з тяжкими формами гіпербілірубінемії. Матеріали і методи. Вивчені особливості соматичного анамнезу, перебігу гестаційного періоду та пологів у 141 жінки, діти яких мали клінічні прояви неонатальної жовтяниці. Основні групи спостереження новонароджених: до I групи увійшли доношені новонароджені діти, які були відповідно розділені на дві підгрупи: підгрупа IA (46 дітей) – діти, які мали середню важкість стану та підгрупа IB (23 дитини) – діти, стан яких був оцінений як важкий. II (контрольну) групу склали 72 здорових доношених новонароджених. До III групи увійшли передчасно народжені діти з терміном гестації з 34-х до 37-ти тижнів). Відповідно, IIIA групу склали 28 новонароджених, які мали середню важкість стану, IIIB групу – із важким загальним станом в ранньому неонатальному періоді. IV групу склали умовно здорові новонароджені діти із зазначеним терміном гестації. Критеріями виключення з дослідження були: передчасні пологи (термін гестації < 34 тижнів), жовтяниця інфекційного генезу (P36), підтверджена вроджена органічна патологія гепатобіліарної системи, зокрема: аномалія розвитку жовчного міхура, атрезія жовчовивідних протоків (Q44), вроджений вірусний гепатит (P53.3). Результати та їх обговорення. Материнськими факторами, що ускладнювали перебіг вагітності і мали значення для формування важкості перебігу патології у дітей, які мали клінічні прояви гіпербілірубінемії, при перинатальній патології були: вік матері, особливо при передчасному народженні, непліддя та самовільні викидні в анамнезі, плацентарна дисфункція, загроза передчасних пологів при даній вагітності, ізоїмунізація за резус-фактором. За шкалою Risk Score for Neonatal Hyperbilirubinemia (2004), було відмічено деяку тенденцію щодо збільшення ризику важкості гіпербілірубінемії за умов перинатальної патології у доношених новонароджених дітей, однак у передчасно народжених дітей подібної тенденції не спостерігалося. Найбільш частими клінічними симптомами у новонароджених за наявності гіпербілірубінемії при перинатальній патології були: гепатоспленомегалія, порушення функції кишечника, гіпоглікемія, анемічний синдром, поєднані геморагічні розлади. Показники біохімічного спектру крові новонароджених вказували на підвищений рівень загального білірубину сироватки, переважно за рахунок непрямой фракції, знижений рівень загального білка, альбуміну та глюкози, вірогідне підвищення активності АсАТ при середній важкості стану, що свідчить про його активацію, при зниженні показника при важкому стані - у доношених новонароджених; у передчасно народжених дітей активність АсАТ мала тенденцію до зниження як при середньому, так і при важкому стані новонароджених. Показник АлАТ мав вірогідне підвищення активності у кореляції зі зростанням важкості стану в доношених новонароджених при зниженій ферментативній реакції – у передчасно народжених дітей. Висновки. 1. Оцінка ймовірності розвитку важкої гіпербілірубінемії у новонароджених дітей повинна бути комплексною, зважати на фактори ризику з боку матері з урахуванням її соматичного, акушерсько-гінекологічного анамнезу, перебігу вагітності та пологів, з проведенням бальної оцінки чинників ризику згідно рекомендацій «Risk Score for Neonatal Hyperbilirubinemia» (2004). 2. Важливу роль для попередження розвитку важких форм гіпербілірубінемії відіграє оцінка ризиків в новонародженого, з урахуванням характеру перебігу перинатальної патології, своєчасним виявленням клінічних симптомів, властивих для порушень метаболізму й транспорту білірубину.

Ключові слова: новонароджений, неонатальна жовтяниця, гепатобіліарна система.

Вступ

Неонатальна жовтяниця - патологічний стан, що охоплює 60 – 80 % новонароджених, який становить як потенційну небезпеку адаптації у дітей після народження, так і ризик розвитку віддалених наслідків гіпербілірубінемії у подальшому [1]. Сучасні клінічні настанови в неонатології містять перелік груп ризику новонароджених щодо тяжких форм неонатальної жовтяниці, проте бракує достовірності клініко-параклінічних критеріїв, які б дозволили прогно-

зувати важкість перебігу патології, а також, визначити предиктори та ранні ознаки дисфункції гепатобіліарної системи для проведення своєчасної медикаментозної корекції в неонатальному періоді. На даний час також недостатньо даних щодо катamnестичного спостереження за дітьми, які перенесли жовтяницю в ранньому неонатальному періоді для аналізу ймовірності впливу патології на формування функціональних та хронічних захворювань гепатобіліарної системи у подальші роки життя.

Аналіз перебігу гестаційного періоду в жінок є важливим для більш чіткого розуміння впливу стану здоров'я матері при даній патології у новонароджених. Вважається, що стан фізичного, соматичного, репродуктивного і навіть психологічного здоров'я вагітної жінки має суттєвий вплив на особливості внутрішньоутробного розвитку плода та є одними з ключових факторів у формуванні здоров'я майбутньої дитини у майбутньому[2].

На даний час все більше уваги у сучасній науковій літературі привертають до себе довгострочені наслідки перинатальної патології, що стосується також і жовтяниць неонатального періоду. Переглянувши літературні дані, представлені наукометричними базами Scopus та Web of Science, можна знайти огляди, в яких описується зв'язок гіпербілірубінемії неонатального періоду у подальшому з розвитком нейросенсорної туговухості [3]; впливу некон'югованого білірубину на нервову систему з розвитком тяжких форм білірубінової енцефалопатії (БЕ) або ядерної жовтяниці [4]; а також, схильність у дітей до алергічних захворювань [5,6] та цукрового діабету 1 типу[7].

На нашу думку, більш чітка ідентифікація факторів ризику з урахуванням анамнезу та соматичної патології у матері, клініко-параклінічних особливостей перебігу раннього неонатального періоду надасть змогу своєчасно прогнозувати ймовірність розвитку важкої гіпербілірубінемії у дитини, призначити відповідне лікування, своєчасно встановити можливість розвитку негативних наслідків у майбутньому для створення індивідуальної програми катамнестичного спостереження та реабілітації для попередження розвитку функціональної та хронічної патології, у тому числі, гепатобілярної системи.

Мета дослідження

Провести аналіз факторів ризику соматичної патології, перебігу вагітності та пологів у матері, клініко-параклінічних особливостей ранньої неонатальної адаптації у дітей з урахуванням гестаційного віку при народженні для виявлення груп ризику новонароджених з тяжкими формами гіпербілірубінемії.

Матеріали і методи дослідження

На основі даних обмінної карти вагітної (Ф №113/о) були вивчені особливості соматичного анамнезу, перебігу гестаційного періоду та пологів у 141 жінки, діти яких мали клінічні прояви неонатальної жовтяниці.

Основні групи спостереження були створені за результатами вивчення медичної карти новонародженого (Ф № 097/о). До I групи увійшли доношені новонароджені діти, які були відповідно розділені на дві підгрупи: підгрупа IA (46 дітей) –

діти, які мали середню важкість стану та підгрупа IB (23 дитини) – діти, стан яких був оцінений як важкий. II (контрольну) групу склали 72 здорових доношених новонароджених. До III групи увійшли передчасно народжені діти з терміном гестації з 34-х до 37-ти тижнів). Відповідно IIIA групу склали 28 новонароджених, які мали середню важкість стану, IIIB групу – із важким загальним станом в ранньому неонатальному періоді. IV групу склали умовно здорові новонароджені діти із зазначеним терміном гестації.

Критеріями виключення з дослідження були: передчасні пологи (термін гестації < 34 тижнів), жовтяниця інфекційного ґенезу (P36), підтверджена вроджена органічна патологія гепатобілярної системи, зокрема: аномалія розвитку жовчного міхура, атрезія жовчовивідних протоків (Q44), вроджений вірусний гепатит (P53.3).

Комплекс біохімічних досліджень сироватки крові новонароджених проведено з використанням аналізатору "ULTRA" фірми "Kone" (Фінляндія, реактиви фірми) та апарату для електрофорезу "PARAGON" фірми "Bekman" (Австрія, реактиви фірми) в умовах біохімічної лабораторії рододопоміжного закладу.

Обстеження новонароджених дітей проводилося з дотриманням основних положень Good Clinical Practice (1996 р.), Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину (1997 р.), Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення наукових медичних досліджень за участю людини (1964-2008 рр.), Наказу МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р. (зі змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ України № 523 від 12.07.2012 р.) та схвалено Комісією з питань біомедичної етики Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет».

Для достовірного аналізу виявлених факторів ризику проводилася оцінка даних з використанням програмного забезпечення Statistica, 2010, програми MedCalc (<https://www.medcalc.org/index.php>). Співвідношення шансів (OR), його стандартна похибка і 95% довірчий інтервал розраховувалися по Altman, 1991. Показник $p < 0,05$ рахувався як статистично значимий.

Дисертаційна робота виконується в межах НДР кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» на тему «Удосконалення напрямків прогнозування, діагностики і лікування перинатальної патології у новонароджених та дітей раннього віку, оптимізація схем катамнестичного спостереження та реабілітації» (№ державної реєстрації 0115U002768, термін виконання 01.2015 р. – 12.2019 р.).

Результати та обговорення

У ході виконання наукової роботи нами проведено аналіз соматичного та акушерсько-гінекологічного анамнезу, а також, перебігу вагітності та пологів у матерів, діти яких мали клінічні прояви гіпербілірубінемії в ранньому неонатальному періоді. Вивчено особливості клініко-параклінічної адаптації новонароджених з урахуванням терміну гестації при народженні та

ступеня важкості загального стану на першому тижні життя.

Слід відмітити, що з урахуванням відповідності гестаційному віку при народженні суттєвих відмінностей щодо антропометричних показників в групах спостереження не відмічалось. Співвідношення за статтю у створених групах також не мали суттєвої різниці. Порівняльна характеристика новонароджених представлена у табл. 1.

Таблиця 1
Порівняльна характеристика новонароджених груп спостереження за статевими та антропометричними ознаками

Показники	I група (доношені діти) N (141)			II група (недоношені діти) N (65)		
	II група N (72)	I група		IV група N (18)	III група	
		IA	IB		III A	III Б
		N _A (46)	N _Б (23)		N _A (28)	N _Б (19)
Співвідношення хлопчики: дівчатка	1:1	1,6:1	1:1,1	1:1,25	1:1,15	1:1,25
Вага (г)	3332,6±433,00	3320,7±440,00	3382,7±391,00	2352,0±346,00	2154,0±468,00	2173,0±250,00
Зріст (см)	53,11±2,67	53,09±2,37	53,47±2,5	45,2±1,8	45±2,2	43,±2,4

Оцінка за шкалою Апгар при народженні на 1-й та 5-й хвилини життя складала: у доношених дітей (IA група - 7,4±0,79 та 8,2±0,76 бали; IB група - 7,0±1,30 та 8,0±1,16 бали; II група - 7,6±0,74 та 8,6±0,97 бали); у передчасно народжених дітей (IIIA група - 6,3±0,80 та 7,1±0,60 бали; IIIB група - 5,1±1,00 та 6,6±0,80 бали; IV група - відповідно 5,1±1,00 та 6,6±0,80 бали).

Обґрунтування щодо вивчення анамнестичних даних матері в комплексі досліджень особливостей перебігу жовтяниці у новонароджених обумовлені даними наукової літератури щодо впливу стану здоров'я матері на антенатальний розвиток та стан здоров'я дитини після народження. Зокрема зазначається, що стан фізичного, соматичного, репродуктивного і навіть психологічного здоров'я вагітної жінки створюють засади певного фону гестаційного періоду і є ключовими моментами у формуванні здоров'я майбутньої дитини [8, 9, 10].

З метою аналізу факторів ризику розвитку неонатальної жовтяниці, з урахуванням гестаційного віку та тяжкості стану новонароджених за умов перинатальної патології ми проаналізували форми № 097/о «Медична карта новонародженого» у дітей груп спостереження. Отримані результати представлені в табл. 2.

За даними проведеного аналізу материнськими факторами, що ускладнювали перебіг вагітності і мали значення для формування важкості перебігу патології у дітей, які мали клінічні прояви гіпербілірубінемії, при перинатальній патології були: вік матері, особливо при передчасному народженні (15,21% у IA групі, порівняно з 1,39% у II групі, $p<0,05$; 26,30% у IIIB групі, порівняно з 5,55% у IV групі, $p<0,05$); непліддя та самовільні викидні а анамнезі (26,30% у IIIB групі, порівняно з 5,55% у IV групі, $p<0,05$); наявність плацентарної дисфункції (15,21% у IA групі,

порівняно з 4,17% у II групі, $p<0,05$); загроза передчасних пологів при даній вагітності (35,71% у дітей IIIA групи та 57,89% у дітей IIIB при показнику 5,55 у IV дітей групи, $p<0,05$) та ізоімунізація за резус-фактором (19,56% та 43,47% відповідно у дітей IA та IB групи, $p<0,05$).

Зазначені фактори не є специфічними для можливого прогнозування розвитку гіпербілірубінемії в ранньому неонатальному періоді у новонароджених, проте їх присутність ймовірно обтяжує перебіг вагітності та пологів, знижує адаптаційні можливості новонародженого за умов реалізації перинатальних факторів ризику, що обумовлено у тому числі, порушеннями функціонального стану систем органів, зокрема гепатобіліарної системи.

Основною причиною значної гіпербілірубінемії у новонароджених, за даними літератури, є ізоімунізація крові матері і плоду. Загроза розвитку гемолітичної хвороби новонародженого (ГХН), як по ABO системі, так і по резус фактору вимагають більш ретельного спостереження даної категорії жінок з чітким контролем титру антитіл (АТ) або гемолізину та своєчасною профілактикою анти-D імуноглобуліном. Вважається, що чим вищий титр АТ у матері в процесі вагітності, тим інтенсивніший гемоліз еритроцитів у плода і новонародженого. Проте практично така закономірність проявляється далеко не завжди [11]. Це пояснюється тим, що титр АТ є кількісною, а не функціональною (якісною) характеристикою АТ. Однак, клінічні прояви гіпербілірубінемії досить часто супроводжують інші патологічні стани періоду новонародженості, що поглиблює важкість стану в ранньому неонатальному періоді. Причини цього є досить різноманітними, що пов'язано з різними порушеннями ланцюгів перетворення й транспорту білірубіну в організмі.

Таблиця 2
Фактори ризику розвитку неонатальної жовтяниці
з урахуванням важкості стану та гестаційного віку новонароджених дітей

Показники	I група (доношені діти) N (141)						II група (недоношені діти) N (65)					
	II група N (72)		I група				IV група N (18)		III група			
			IA		IB				III A		III Б	
			N _A (46)		N _Б (23)				N _A (28)		N _Б (19)	
n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Місто	45	57,67	26	56,52	15	65,21	10	55,55	18	64,28	12	65,13
Село	27	34,61	20	43,47 [#]	8	17,39	8	44,44	10	35,71	7	36,84
Хлопчики	36	50,00	28	60,86*	11	47,82	8	44,44	13	46,42	8	42,10
Дівчатка	36	50,00	18	39,13*	12	52,17	10	55,55	15	53,57	11	57,89
Соматичний анамнез матері												
ВСД	18	25,00	16	34,78	4	17,39	3	16,66	6	21,42	2	10,52
Анемія	33	45,83	18	39,13	9	39,13	5	27,77	11	39,28	9	47,36
Дифузний нетоксичний зоб	9	12,5	7	17,39	4	17,39	4	22,22	6	21,42	3	15,78
Захворювання ГБС	5	6,94	5	10,86	4	17,39	-	-	4	14,28	1	5,26
Хронічна патологія нирок	6	8,33	3	6,52	3	13,04	2	11,11	5	17,85	5	26,31
Акушерсько-гінекологічний анамнез матері												
Вагітн	15	20,83	13	28,26	4	17,39	2	11,11	4	14,28	1	5,26
Непліддя / самовільні викидні	7	8,33	4	14,28	4	17,37	1	5,55	4	14,28	5	26,30*
Передчасні пологи в анамнезі	-	-	1	6,50	-	-	-	-	2	7,14	3	15,78
Особливості перебігу вагітності у матері												
Загроза передчасних пологів	7	9,72	9	19,52*	2	8,69	1	5,55	10	35,71*	11	57,89*
ПРПО	12	16,67	1	2,17	2	8,69	3	16,66	8	28,57	8	36,84
Прееклампсія	1	1,39	2	4,34	-	-	2	5,55	2	7,14	3	15,78
Ізоімунізація за ABO системою	30	41,67	24	52,17	12	39,13	4	22,22	4	14,28	1	5,26
Ізоімунізація за Rh фактором	24	33,33	9	19,56	10	43,47 [#]	4	22,22	4	14,28	2	10,52
Багатоводдя	8	11,11	7	17,39	3	13,04	1	5,55	1	3,57	2	10,52
Маловоддя	-	-	1	2,17	1	4,35	-	-	-	-	-	-
Плацентарна дисфункція	3	4,17	7	15,21*	2	8,69	4	22,22	7	25,00	1	5,26
Гестаційні набряки	18	25	9	19,56	3	13,04	2	11,11	2	7,14	1	5,26
Особливості пологів у матері												
Перша вагітність	40	55,55	17	36,95	7	30,43*	7	38,88	19	67,85	11	57,89
Перші пологи	41	56,94	22	47,82	7	30,43*	6	33,33	20	71,42	11	57,89
Вікова первістка	1	1,39	7	15,21*	1	4,35	1	5,55	2	7,14	5	26,30*
Вагінальні пологи	58	80,51	35	76,08	18	78,26	11	61,11	16	57,14	12	63,15
Кесарев розтин	14	19,44	6	13	1	4,35	2	11,11	9	32,13	5	26,31
Дистрес плоду	10	13,89	2	4,34	3	13,04	1	5,55	2	7,14	1	5,26
Вакуумекстракція плоду	2	2,78	1	2,17	1	4,35	-	-	-	-	-	-
Пологова слабкість	7	9,72	20	43,47*	4	17,39	-	-	2	7,14	-	-

Примітка: * - вірогідна відмінність у порівнянні з контролем, $p < 0,05$; [#] - вірогідна відмінність між підгрупами спостереження, $p < 0,05$.

За даними літератури, суттєву роль у формуванні порушень адаптації у новонароджених відіграє плацентарна дисфункція, яка є одним з найбільш поширених ускладнень вагітності, її частота становить 17-35%, при невиношуванні - 55-77%.[8] Плацента є органом, що забезпечує адекватне постачання поживних речовин від матері до дитини. Перепади тиску в плацентарних судинах унаслідок ішемії-реперфузії мають велике значення в патогенезі ішемічних уражень плацентарної тканини та життєво важливих органів плода, у тому числі й печінки. Порушення її функції характеризується негативним впливом на плід, численними ускладненнями пологів, порушенням компенсаторно-приспосувальних механізмів у новонародженого та високою перинатальною смертністю [9,10].

Для узагальнення даних та отримання уявлення про фактори ризику неонатальної жовтяниці, що наявні у новонароджених нашого регіону, було проведено аналіз згідно рекомендованої шкали Risk Score for Neonatal Hyperbilirubinemia за даними Keren R, Bhutani VK, Luan X та ін. (2004), показники якої мали підтверджену статис-

тичну значущість зі значенням $p < 0,005$ [12]. Зокрема, згідно рекомендованим, до переліку чинників ризику увійшли: вакуум екстракція плоду, застосування окситоцину під час пологів, термін гестації, вага при народженні та спосіб вигодовування новонародженого. Отримані дані представлені в табл.3.

Виходячи з отриманих результатів досліджень за шкалою Risk Score for Neonatal Hyperbilirubinemia (2004), було відмічено деяку тенденцію щодо збільшення ризику важкості гіпербілірубінемії за умов перинатальної патології у доношених новонароджених дітей - $13,18 \pm 3,13$ та $14,64 \pm 4,06$ балів відповідно у IA та IB групах спостереження у порівнянні з $12,08 \pm 2,4$ балів в II контрольній групі, однак у передчасно народжених дітей подібної тенденції ми не спостерігали.

У ході наукового дослідження була проведена оцінка клінічних проявів патології у групах порівняння, які традиційно супроводжують неонатальну гіпербілірубінемію й, відповідно, характеризують різні ланки порушень перетворення і транспорту білірубину. Отримані дані представлені в табл. 4.

Таблиця 3
Середні значення бальної оцінки чинників ризику
в групах спостереження згідно Risk Score for Neonatal Hyperbilirubinemia ($M \pm m$)

Ознака	I група (доношені діти) N (141)			II група (недоношені діти) N (65)		
	II група N (72)	I група		IV група N (18)	III група	
		IA	IB		III A	III Б
		N _A (46)	N _Б (23)		N _A (28)	N _Б (19)
Середні значення балів за шкалою Risk Score for Neonatal Hyperbilirubinemia (бали)	12,08±2,4	13,18±3,13	14,64±4,06	10,5±2,33	9,77±2,0	9,8±2,1

Таблиця 4
Клінічні симптоми, що супроводжують гіпербілірубінемію, у новонароджених дітей за умов перинатальної патології

Показники	I група (доношені діти) N (141)						II група (недоношені діти) N (65)					
	II група N (72)		I група				IV група N (18)		III група			
			I А		I Б				III А		III Б	
			N _A (46)		N _Б (23)				N _A (28)		N _Б (19)	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Жовтяниця	-	-	41	100	23	100	-	-	28	100	19	100
Гепато- спленомегалія	1	1,39	2	4,35	5	21,74*	1		2	7,14	5	26,31*
Геморагічні розлади	-	-	-	-	2	8,69	-	-	-	-	2	10,52
Гіпоглікемія	-	-	-	-	4	17,39	-	-	-	-	8	42,10
Порушення функції ШКТ	1	1,38	4	4,35	5	21,74*	1	5,55	4	14,28	8	42,1*
Анемічний синдром	-	-	-	-	7	30.43	-	-	-	-	1	5.26

Примітка: * - вірогідна відмінність у порівнянні з контролем, $p < 0,05$;

- вірогідна відмінність між підгрупами спостереження, $p < 0,05$.

Отримані дані показали, що найбільш частими клінічними симптомами у новонароджених за наявності гіпербілірубінемії при перинатальній патології були: гепатоспленомегалія (4,35% та 21,74% відповідно у IA та IB групах, порівняно з показником 1,39% у II групі, $p < 0,05$), що свідчило про дисфункцію ГБС; порушення функції кишечника, більш виражені у дітей IA та IB групи – відповідно 21,74 та 26,31% при показнику 1,38% у новонароджених II групи, $p < 0,05$); гіпоглікемія – у 17,39% випадків при важкому стані у доношених

новонароджених (IB група) та 42,10% випадків при важкому стані у передчасно народжених дітей (IIIБ група); анемічний синдром – у 30,43% при важкому стані у доношених новонароджених (IB група); поєднані геморагічні розлади – у 10,52% при важкому стані у передчасно народжених дітей (IIIБ група).

У ході досліджень були виявлені характерні зміни показників біохімічного аналізу крові. Отримані дані представлені в табл.5.

Таблиця 5
Показники біохімічного спектру крові у новонароджених груп спостереження, у порівнянні з контролем ($M \pm m$)

Показники	I група (доношені діти) N (141)			II група (недоношені діти) N (65)		
	II група N (72)	I група		IV група N (18)	III група	
		IA	IB		III A	III Б
		N _A (46)	N _Б (23)		N _A (28)	N _Б (19)
Загальний білірубін (мкмоль/л)	32,9±2,08	176,35±7,92*	179,81±8,44*	57,47±2,61	132,45±6,12*	193,67±9,55*#
Непрямий (мкмоль/л)	22,3±2,19	167,75±7,83*	170,39±2,86*	49,63±4,48	118,87±5,92*	141.8±6,28*#
АлАТ(од/л)	16,7±1,12	19,41±1,01*	22,39±1,07*#	22,81±1,53	14,25±0,57	16,66±0,83
АсАТ(од/л)	30,5±1,29	59,42±2,87*	54,29±2,54*#	51,90±2,48	52,78±2,53	41,50±2,07
Глюкоза (ммоль/л)	3,32±0,24	3,75±1,22	4,2±1,22	3,12±0,14	3,08±0,13	2,73±0,11
Загальний білок (г/л)	66,37±5,15	65,11±18,77	55,54±6,62	53,29±2,05	52,51±2,64	45,73±1,36
Альбумін (г/л)	33,18±0,9	31,28±1,02	23,82±1,18	28,00±1,32	31,90±1,14	23,66±1,62

Примітка: * - вірогідна відмінність між групами спостереження порівняно з контрольною групою, $p < 0,0001$;

- вірогідна відмінність між підгрупами спостереження, $p < 0,0001$.

Показники біохімічного спектру крові новонароджених, які мали прояви гіпербілірубінемії при перинатальній патології, вказували на підвищений рівень загального білірубину сироватки, переважно за рахунок непрямой фракції, що мало вірогідну відмінність з контрольними показниками як в доношених, так і у передчасно народжених дітей; знижений рівень загального білка, альбуміну та глюкози – відповідно до зростання

тяжкості загального стану. Відмічалось також вірогідне підвищення активності АсАТ при середній важкості стану, що свідчить про його активацію, при зниженні показника при важкому стані – у доношених новонароджених. На відміну, у передчасно народжених дітей показник АсАТ мав тенденцію до зниження активності як при середньому, так і ще більше – при зростанні важкості стану новонароджених. Показник АлАТ мав віро-

гідне підвищення активності у кореляції зі зростанням важкості стану в доношених новонароджених дітей при зниженій ферментативній реакції – у передчасно народжених.

Висновки

1. Оцінка ймовірності розвитку важкої гіпербілірубінемії у новонароджених дітей повинна бути комплексною, зважати на фактори ризику з боку матері з урахуванням її соматичного, акушерсько-гінекологічного анамнезу, перебігу вагітності та пологів, з проведенням бальної оцінки чинників ризику згідно рекомендацій «Risk Score for Neonatal Hyperbilirubinemia» (2004).

2. Важливу роль для попередження розвитку важких форм гіпербілірубінемії відіграє оцінка ризиків в новонародженого, з урахуванням характеру перебігу перинатальної патології, своєчасним виявленням клінічних симптомів, властивих для порушень метаболізму й транспорту білірубіну.

Перспектива подальших досліджень

Проведення аналізу клініко-параклінічних показників, які характеризують функціональний стан гепатобіліарної системи при жовтяницях неонатального періоду.

Конфлікт інтересів. Автори не заявляють будь-якого конфлікту інтересів.

Фінансування. Тема НДР кафедри ініціативна, виконується на основі самофінансування.

Література

1. Maisels MJ. Managing the jaundice of newborn: a persistent challenge. CMAJ. 2015 Mar;187(5):335-43. DOI: <https://doi.org/10.1503/cmaj.122117>
2. Roos N, Tunçalp Ö, Kerber K, Allanson E, Costello A, Askew I, et al. Learning from every stillbirth and neonatal death. Lancet. 2016;388:741-3. DOI: 10.1016/S0140-6736(16)31352-6
3. Sanjiv B, Amin S, Wang H, Laroia N, Orlando M. Unbound Bilirubin and Auditory Neuropathy Spectrum Disorder in Late Preterm and Term Infants with Severe Jaundice. The Journal of Pediatrics. 2016 Jun;173:84-89. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2016.02.024>
4. Cayabyab R., Ramanathan R. High unbound bilirubin for age: a neurotoxin with major effects on the developing brain. Pediatric Research. 2019; 85:183-190. DOI: 10.1038 / s41390-018-0224-4
5. Gloria-Bottini F, Bottini E. Is there a role of early neonatal events in susceptibility to allergy. Int J Biomed Sci. 2010 Mar;6(1):8-12.
6. Das RR, Naik SS. Neonatal hyperbilirubinemia and childhood allergic diseases: a systematic review. Pediatr Allergy Immunol. 2015 Feb; 26 (1): 2-11. DOI: <https://doi.org/10.1111/pai.12281>
7. Liao PF, Tsai JD, Chen HJ, Pan HH, Hung TW, Chang HY & show all, Neonatal hyperbilirubinaemia is associated with a subsequent increased risk of childhood-onset type 1 diabetes. Paediatrics and International Child Health. 2019 Apr. DOI: <https://doi.org/10.1080/20469047.2019.1600854>
8. Li Y, Gonzalez P, Zhang L. Fetal stress and programming of hypoxic/ischemic-sensitive phenotype in the neonatal brain: mechanisms and possible interventions. Progress in Neurobiology. 2012;98(2):145-65. DOI: 10.1016/j.pneurobio.2012.05.010
9. Mutinati M, Pantaleo M, Roncetti M, Piccinno M, Rizzo A, Sciorsci RL. Oxidative stress in neonatology: a review. Reprod Domest Anim. 2014;49(1):7-16. DOI: 10.1111/rda.12230
10. Boskabadi H, Zakerihamidi M, Heidarzadeh M, Avan A, Ghayour-Mobarhan M, Ferns GA. The value of serum pro-oxidant/antioxidant balance in the assessment of asphyxia in term neonates. J Matern Fetal Neonatal Med. 2017;30(13):1556-61. DOI: 10.1080/14767058.2016.1209655
11. Basu S, Kaur R, Kaur G. Hemolytic disease of the fetus and newborn: Current trends and perspectives. Asian J Transfus Sci. 2011 Jan; 5(1): 3-7. DOI: <http://dx.doi.org/10.4103/0973-6247.75963>
12. Keren R, Bhutani VK, Luan X, Nihitnova S, Cnaan A, Schwartz J. Identifying newborns at risk of significant hyperbilirubinaemia: a comparison of two recommended approaches. Acute paediatrics. 2005 Apr;90(4):415-421. DOI: <http://dx.doi.org/10.1136/adc.2004.060079>

Реферат

КЛИНИКО-ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА

Волосивская Ю.М., Годованец А.С.

Ключевые слова: новорожденный; неонатальная желтуха; гепатобилиарная система.

Современные клинические рекомендации в неонатологии содержат перечень групп риска новорожденных касательно развития тяжелых форм неонатальной желтухи, однако на сегодня недостаточно достоверных клинико-параклинических критериев, которые позволили бы прогнозировать тяжесть течения патологии, а также, определить предикторы и ранние признаки дисфункции гепатобилиарной системы для проведения своевременной медикаментозной коррекции в неонатальном периоде. Цель исследования. Провести анализ факторов риска соматической патологии, течения беременности и родов у матери, клинико-параклинических особенностей ранней неонатальной адаптации у детей с учетом гестационного возраста при рождении для выявления групп риска новорожденных с тяжелыми формами гипербилирубинемии. Материалы и методы. Изучены особенности соматического анамнеза, течения гестационного периода и родов у 141 женщины, дети которых имели клинические проявления неонатальной желтухи. Основные группы наблюдения новорожденных: в I группу вошли доношенные новорожденные дети, которые были соответственно разделены на две подгруппы: подгруппа IA (46 детей) - дети, которые имели состояние средней степени тяжести и подгруппа IB (23 ребенка) - дети, состояние которых было оценено как тяжелое. II (контрольную) группу составили 72 здоровых доношенных новорожденных. В III группу вошли преждевременно родившиеся дети со сроком гестации от 34-х до 37-ми недель. Соответственно, IIIA группу составили 28 новорожденных, которые имели среднюю тяжесть состояния, IIIB группу - с тяжелым общим состоянием в раннем неонатальном периоде. IV группу составили условно здоровые новорожденные дети с вышеуказанным сроком гестации. Критериями исключения из исследования были: преждевременные роды (срок гестации < 34 недель), желтуха инфекционного генеза (P36), подтвержденная врожденная органическая патология гепатобилиарной системы, в частности: аномалия развития желчного пузыря, атрезия желчевыводящих путей (Q44), врожден вирусный гепатит (P53.3). Результаты и их обсуждения. Материнскими факторами, отягощающими течение беременности и имевшими значение для формирования тяжести патологии у детей с клиническими проявлениями гипербилирубинемии при перинатальной патологии были: воз-

раст матери, особенно при преждевременных родах, бесплодие и произвольные выкидыши в анамнезе, плацентарная дисфункция, угроза невынашивания при данной беременности, изоиммунизация по резус-фактору. По шкале Risk Score for Neonatal Hyperbilirubinemia (2004), была отмечена некоторая тенденция относительно увеличения риска тяжести гипербилирубинемии при наличии перинатальной патологии у доношенных новорожденных детей, однако у недоношенных детей подобной тенденции не наблюдалось. Наиболее частыми клиническими симптомами у новорожденных при наличии гипербилирубинемии при перинатальной патологии были: гепатоспленомегалия, нарушение функции кишечника, гипогликемия, анемический синдром, геморрагические расстройства. Показатели биохимического спектра крови новорожденных указывали на повышенный уровень общего билирубина сыворотки, преимущественно за счет непрямой фракции, сниженный уровень общего белка, альбумина и глюкозы, достоверное повышение активности АсАТ при средней тяжести состояния, при снижении показателя при тяжелом состоянии у доношенных новорожденных; у преждевременно родившихся детей активность АсАТ имела тенденцию к снижению как при среднем, так и при тяжелом состоянии новорожденных. Показатель АлАТ имел достоверное повышение активности в корреляции с ростом тяжести состояния у доношенных новорожденных при снижении ферментативной активности - у недоношенных детей. Выводы. 1. Оценка вероятности развития тяжелой гипербилирубинемии у новорожденных детей должна быть комплексной, учитывать факторы риска со стороны матери, принимая во внимание особенности ее соматического, акушерско-гинекологического анамнеза, течения беременности и родов, с проведением бальной оценки факторов риска согласно рекомендаций «Risk Score for Neonatal Hyperbilirubinemia» (2004). 2. Важную роль для предупреждения развития тяжелых форм гипербилирубинемии играет оценка рисков у новорожденного, с учетом особенностей течения перинатальной патологии, своевременным выявлением клинических симптомов, свойственных для нарушений метаболизма и транспорта билирубина.

Summary

CLINICAL AND PARACLINICAL ASPECTS OF FORECASTING OF SEVERE FORMS OF HYPERBILIRUBINEMIA OF NEONATAL PERIOD

Volosivska Y., Hodovanets O.

Key words: newborn; neonatal jaundice; hepatobiliary system.

Modern clinical guidelines in neonatology consist list of risk groups of severe form of neonatal jaundice in newborns, but there is a lack of authenticity of clinical and paraclinical criteria's, which could have allowed to forecast the severity of pathological course and to define the predictors and early signs of dysfunction of hepatobiliary system for timely conducting of medical correction in neonatal period.

Objective. To conduct the analysis of risk factors of somatic pathology, course of pregnancy and childbirth of pregnant, clinical and paraclinical peculiarities of early neonatal adaptation of kids considering gestational age in time of birth for defining of risk groups of newborns with severe form of hyperbilirubinemia.

Materials and methods. Researched peculiarities of somatic anamnesis, gestational periods course and childbirth of 141 women, whose kids had clinical signs of neonatal jaundice. Main researched groups of newborns: I group includes mature newborns, who were divided on two subgroups: subgroup IA (46 kids) – kids that had middle condition severity and subgroup IB (23 kids) – kids with severe condition. II (control) group consist of 72 healthy mature newborns. III group includes premature newborns with gestation period 34 – 37 weeks. Consequently, IIIA group consist of 28 newborns with middle condition severity, IIIB group – kids with severe general condition in neonatal period. IV group includes conditionally healthy newborns with defined gestation period. Criteria of excluding from research were: premature childbirth (gestation period < 34 weeks), infectious genesis jaundice (P36), confirmed congenital organic pathology of hepatobiliary system, in particular: anomaly of development of gallbladder, atresia of bile duct (Q44), congenital viral hepatitis (P53.3)

Result and discussions. Maternity factors that complicate the pregnancy course and had an importance for severity of pathological course in kids, who had a clinical sign of hyperbilirubinemia in perinatal pathology: age of pregnant, especially in premature childbirth, infertility and uncontrolled misbirth of anamnesis, placental dysfunction, threat of premature birth in this pregnancy by rhesus factor. According to scale "Risk Score for Neonatal Hyperbilirubinemia" (2004), was distinguished some tendency of increasing of severity risk of hyperbilirubinemia in perinatal pathology of mature newborns, but that tendency didn't exist in premature newborns. The most frequent clinical symptoms in newborns with hyperbilirubinemia in perinatal pathology were: hepatosplenomegaly, bowels dysfunction, hypoglycemia, anemic syndrome, combined hemorrhagic disorders. Indicators of biochemical blood's spectrum of newborns showed increased level of general bilirubin serum, mainly for non-conjugate fraction, decreased level of general protein, albumin and glucose, possible increasing of AsAT activity in middle severity of condition, that tells about its activation, decreasing of indicator in severe condition; AsAT activity of premature newborns had a tendency of increasing in both middle and severe condition of newborns. AlAT indicator had a possible increasing of activity in correlation with increasing of conditions severity of mature newborns and decreased ferment

reaction – in premature newborns. Conclusions. 1. Estimation of probability of severe hyperbilirubinemia development in newborns has to be complex, considering risk factors of pregnant and her somatic, obstetric and gynecological anamnesis, course of pregnancy and of childbirth and with conducting of marks estimation of factors according recommendations of «Risk Score for Neonatal Hyperbilirubinemia» (2004). 2. Important role for prevention of development of severe form of hyperbilirubinemia has estimation of risks in newborns, considering nature of perinatal pathology course, timely detection of clinical symptoms, existent in disorders of metabolism and transport of bilirubin.

DOI 10.31718/2077-1096.19.4.15

УДК 618.6-053.3:614.25

Козакевич В. К., Зюзіна Л. С., Козакевич О. Б., Жук Л. А., Мелашенко О. І.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПІДТРИМКИ ЛАКТАЦІЇ ТА ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ НЕМОВЛЯТ В ДІЯЛЬНОСТІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

Вступ. Грудне вигодовування є природною, сформованою під час еволюції формою харчування немовлят, що визначає оптимальне формування здоров'я дитини, її фізичний, психічний та інтелектуальний розвиток. *Мета дослідження.* Вивчити вплив соціальних, інформаційних та психологічних чинників на тривалість грудного вигодовування. *Матеріали та методи.* Обстежено 200 пар мати – дитина. *Результати дослідження.* За даними анкетування встановлено, що на першому місяці життя на грудному вигодовуванні знаходилися 86,4 % дітей. В 6 місяців грудне молоко в раціоні зберігалося приблизно у 58,5 %, до 1 року – у 29,0 % обстежених дітей. Дослідження стану здоров'я дітей залежно від тривалості грудного вигодовування засвідчило, що діти, які були здоровими, довше перебували на виключно грудному вигодовуванні та грудному вигодовуванні, ніж ті, які мали які-небудь захворювання протягом першого року життя. Медіана тривалості виключно грудного вигодовування у здорових дітей становила 3 місяці, а у дітей, які хворіли – 1 місяць. Обговорено питання підтримки грудного вигодовування в роботі сімейного лікаря, роль професійної консультації, допоміжної медичних працівників для становлення тривалої та достатньої лактації. Встановлено, що застосування сучасних перинатальних технологій ведення вагітності, пологів і новонародженого забезпечує виключно грудне вигодовування до 6 місяців віку дитини та оптимальне грудне вигодовування. Доведено, що інформаційна підготовка матерів до грудного вигодовування, психологічна підтримка з боку оточення позитивно впливає на тривалість грудного вигодовування і стан здоров'я дитини. *Висновки.* Лактація та грудне вигодовування – процес складний, але цілком керований.

Ключові слова: грудне вигодовування, лактація, пара «мати – дитина», тривалість грудного вигодовування, принципи підтримки грудного вигодовування.

Зв'язок публікації з плановими науково-дослідними роботами. НДІ ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології» АМН України «Розробити та впровадити систему медико-психологічного супроводу для новонароджених груп ризику з формування хронічної захворюваності, інвалідності та затримки розвитку» (№ держреєстрації 0117U004538)

Вступ

Одним із основних чинників, які зумовлюють стан здоров'я дітей як на ранньому етапі їх життя, так і в подальшому, є повноцінне харчування у дитячому віці [4, 5, 8, 11]. Численними епідеміологічними й клінічними дослідженнями доведено, що грудне вигодовування є природною, сформованою під час еволюції формою харчування немовлят та визначає оптимальне формування здоров'я дитини, її фізичний, психічний та інтелектуальний розвиток [2, 3, 12]. Впровадження сучасних принципів ведення лактації та грудного вигодовування згідно міжнародної ініціативи «Лікарня, доброзичлива до дитини» дозволило поліпшити ситуацію з поширенням і тривалістю грудного вигодовування, у тому числі в Україні [3, 4, 7, 9]. Але дані епідеміологічних досліджень, які були проведені у різних країнах світу, показали, що існують регіональні особливості виникнення порушень лактації у жінок [1, 13, 14]. Тому виникає необхідність у проведенні моніторингу

поширеності і тривалості ГВ з метою вивчення причин, що призводять до гіпогалактії.

Мета дослідження

Вивчення впливу соціальних, інформаційних та психологічних чинників на тривалість грудного вигодовування.

Матеріали та методи дослідження

Для вирішення поставлених завдань було обстежено 200 пар мати – дитина. Проведене опитування матерів за розробленою анкетой, яка містила питання щодо соціального, соматичного, акушерського анамнезу матері, соціально-економічного статусу сім'ї, загального стану здоров'я дітей, а також ключові показники успішного грудного вигодовування (УГВ), включаючи показники тривалого виключно грудного вигодовування (ВГВ) та грудного вигодовування (ГВ), строк переведення дитини на змішане вигодовування (ЗВ) та штучне вигодовування (ШВ).

Для статистичної обробки результатів дослі-