Summary

CHARACTERISTICS OF PHARMACEUTICAL THERAPY OF HIGH-RISK PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING

Gogayeva O.

Key words: coronary artery disease, high-risk patient, coronary bypass grafting, off-pump, drug therapy, dual antiplatelet therapy.

The number of patients after surgical myocardial revascularization is growing annually. New regional centres are being created, and the cardiologists are facing the pressing issues of managing patients after cardiac surgery. The aim of this study is to analyze the characteristics of pharmaceutical therapy for high-risk patients with coronary artery disease after surgical myocardial revascularization. Material and methods: a retrospective analysis of data from 194 high-risk patients (selected by random sampling) with coronary artery disease, who were operated on and discharged from Amosov National Institute of cardiovascular surgery, National Academy of Medical Sciences of Ukraine for the period 2009–2019. The average age of the patients was 64.2 ± 8.9 years. All patients underwent standard laboratory and clinical examinations, coronary angiography and coronary artery bypass grafting. Results: dual antiplatelet therapy has been found out as optimal for the patients with sinus rhythm. A combination of an antiplatelet agent with a vitamin K antagonist or new oral anticoagulants is effective and can be recommended for the patients with atrial fibrillation. Lipid-lowering therapy is prescribed to all patients prior to the surgery and the following parameters as the control of low-density lipoproteins, liver enzymes, and serum creatinine should be under the constant control. Gastroprotective therapy with pantoprazole is indicated to all patients after myocardial revascularization. When prescribing antihypertensive therapy in the postoperative period, it is important to consider the severity of stenosis of the carotid arteries. Conclusions: Pharmaceutical therapy of patients after coronary artery bypass surgery should be carried out in a patient-centred manner and in accordance with the principle – “non nocere” (Do not harm), taking into account the cardiac status and comorbidity.

DOI 10.31718/2077-1096.21.1.11

УДК 616-071+616.441+616.12-008.1+615.22

Данилюк О.І.

ЯТРОГЕННІ ЗМІНИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У ХВОРИХ ІЗ ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ ПІД ВПЛИВОМ АМІОДАРОНУ

Івано-Франківський національний медичний університет

Метою дослідження було проведення аналізу частоти структурно-функціональних змін щитоподібної залози, які виникають при регулярному прийомі аміодарону хворими з фібриляцією передсердь упродовж 12 місяців. В основу дослідження покладено обстеження 80 хворих (28 жінок і 52 чоловіки) на кардіосклероз (дифузний та постінфарктний) із фібриляцією передсердь і серцевою недостатністю ІІА у віці ($63,5 \pm 1,3$) року та 15 практично здорових осіб відповідного віку ($62,4 \pm 2,4$) року – чоловіків і жінок у аналогічній пропорції. Основним критерієм включення був еутиреоїдний стан щитоподібної залози до призначення антиаритмічної терапії. Для оцінки функціонального стану щитоподібної залози досліджували вміст у сироватці крові: вільного тироксину, вільного трийодтироніну, антитіл до тиреопероксидази. Обстеження проводили до лікування, через 3, 6, 9 та 12 місяців від початку дослідження на тлі антиаритмічної терапії. Для діагностики структурних змін щитоподібної залози проводили ультразвукове дослідження. У залежності від призначеного лікування обстежених хворих розподілили наступним чином: І група – хворі, котрі отримували аміодарон у дозі 200 мг на добу на тлі базової терапії ($n=60$); контрольна група – хворі, котрі отримували на тлі базової терапії, як антиаритмічні засоби, дигоксин і бісопролол ($n=20$). Лікування аміодароном протягом 1 року викликало дисфункцію щитоподібної залози у 33,3% пацієнтів. Провідним у структурі аміодароніндукованих дисфункцій щитоподібної залози є гіпотиреоз (20,0%), субклінічний в 11,7% хворих. Розвиток аміодароніндукованого тиреотоксикозу спостерігався у 13,3% пацієнтів, причому перші випадки гіперфункції щитоподібної залози були виявлені не раніше, ніж через півроку. Під впливом аміодарону в перші місяці лікування сироваткові рівні вільного тироксину можуть підвищуватись, а вільного трийодтироніну знижуватись, можлива тенденція до незначного підвищення рівнів тиреотропного гормону в перші тижні лікування. Вищезгадані зміни лабораторних показників мають транзиторний характер і не супроводжуються погіршенням антиаритмічних властивостей аміодарону.

Ключові слова: щитоподібна залоза, функціональний стан, фібриляція передсердь, аміодароніндуковані тиреопатії

Вступ

Фібриляція передсердь (ФП) є актуальною проблемою сучасної кардіології та аритмології. Серед дорослого населення поширеність ФП становить 0,5-2,0 %, а серед людей похилого ві-

ку – 10-15 % [3]. На сьогоднішній день від цієї аритмії страждають понад 6 мільйонів європейців, при цьому очікується, що в наступні 50 років захворюваність на ФП стане вдвічі вищою, ураховуючи старіння населення. ФП асоціюється з підвищеним ризиком смерті, ішемічного інсульту,

серцевої недостатності (СН) та госпіталізацій, зниженою якістю життя [4].

Ураховуючи те, що для більшості регіонів України, особливо Прикарпаття, характерним є дефіцит йоду в довкіллі, що призводить до розвитку в 30 % здорових осіб таких патологій як ендемічний дифузний і вузловий зоб (ВЗ) без порушення функції щитоподібної залози (ЩЗ) [1], а також інволютивні зміни структури ЩЗ, поширеність аутоімунного тиреоїдиту (АІТ), що зросла на 68 % за останні 10 років, і його розповсюдженість від 6 до 11 % в осіб, старших за 60 років [6] можна зробити висновок, що поєднання структурної патології ЩЗ і ФП є достатньо частим.

Високоєфективним препаратом для лікування хворих із надшлуночковими та шлуночковими аритміями, – є аміодарон [4,7]. Оскільки аміодарон це йодовмісний препарат (1 таблетка містить 37 % йоду), то він, окрім антиаритмічної дії, може здійснювати вплив на функцію ЩЗ. Проблемі порушення функціонального стану ЩЗ на тлі прийому аміодарону приділяється багато уваги як українськими, так і зарубіжними авторами [2,9,10,12]. Виробленої тактики щодо застосування аміодарону у хворих із порушеннями ритму серця при структурних змінах ЩЗ не існує, що спонукало до проведення даного наукового дослідження. Тим більше, що на тлі структурних та аутоімунних змін ЩЗ частота аміодароніндукованої дисфункції може зростати [11,12].

Хоча більшість пацієнтів, котрі приймають аміодарон, залишаються клінічно еутиреоїдними, у 2-24% випадків розвивається аміодароніндукований гіпотиреоз (АМІГ) або аміодароніндукований тиреотоксикоз (АМІТ). Однак, незважаючи на проведені дослідження, патофізіологічні механізми аміодароніндукованої цитотоксичності залишаються мало зрозумілими [2,12].

Обговорюється роль ендотеліальної дисфункції (ЕД), оксидантного стресу та метаболічної інтоксикації в патогенезі аміодароніндукованої дисфункції ЩЗ. Загальновідомим є те, що при захворюваннях ЩЗ погіршується ендотеліальна функція, розвивається оксидантний стрес. Відомою є роль ЕД і в патофізіології кардіоваскулярних захворювань, зокрема в пацієнтів із порушеннями ритму серця ішемічного генезу [8].

Матеріали і методи

В основу дослідження покладено обстеження 80 хворих (28 жінок і 52 чоловіки) на кардіосклероз (дифузний та постінфарктний) із ФП і СН ІІА у віці ($63,5 \pm 1,3$) року та 15 практично здорових осіб відповідного віку ($62,4 \pm 2,4$) року – чоловіків і жінок у аналогічній пропорції. Основним критерієм включення був еутиреоїдний стан ЩЗ до призначення антиаритмічної терапії.

В проведеному нами дослідженні переважали чоловіки похилого віку. Серед клінічних форм ІХС у переважній більшості пацієнтів діагностували дифузний кардіосклероз, у третини хворих анамнестично виявлявся перенесений Q-

інфаркт міокарда. У більшій половині обстежених діагностували ГХ ІІ–ІІІ стадій, ІІІ ФК СН за NYHA. Підставою для призначення лікування досліджуваним хворим була наявність пароксизмальної / персистуючої форми фібриляції передсердь та дещо рідше постійної форми.

У залежності від призначеного лікування обстежених хворих розподілили наступним чином: І група – хворі, котрі отримували аміодарон у дозі 200 мг на добу на тлі базової терапії ($n=60$); контрольна група – хворі, котрі отримували на тлі базової терапії, як антиаритмічні засоби, дигоксин у дозі 0,25 мг на добу, усередині і бісопролол у дозах 2,5-10 мг на добу ($n=20$).

Усі хворі з метою зменшення симптомів основного захворювання та ускладнень отримували базову терапію: інгібітор АПФ, антагоніст альдостерону, статин, антитромботичний засіб, антитромбоцитарний препарат, салуретик.

Пацієнтам аміодарон було призначено вперше. Антиаритмічне лікування аміодароном у таблетках по 200 мг (Кордарон) здійснювали в 2 етапи: 1-й етап – насичення і 2-й – підтримуючої терапії. Із метою насичення дозу аміодарону підбирали індивідуально з розрахунку 10 мг/кг маси тіла на добу. У середньому доза насичення складала 800 мг на добу. Критерієм насичення аміодарону вважали: подовження інтервалу Q-T до $0,420 - 0,440$ мс. Підтримуючу дозу аміодарону призначали за схемою – 1 таблетка (200 мг) на добу 5 днів на тиждень із 2-денною перервою.

Порушення ритму серця діагностували на підставі клінічних, електрокардіографічних, ехокардіографічних та лабораторних методів обстеження згідно з протоколами надання медичної допомоги хворим із фібриляцією (тріпотінням) передсердь [3]. Для оцінки функціонального стану ЩЗ досліджували вміст у сироватці крові: вТЗ, ТТГ – наборами DRG (США), вТ4 – наборами Алкор-Био (Росія); АТ-ТПО – за допомогою наборів Orgentec GmbH (Німеччина). Рівень гормонів визначали на мікропроцесорному біохімічному аналізаторі «Stat Fax 1904 plus». Ультразвукове дослідження ЩЗ проводили на апараті Sonoline Elegra («Siemens», Німеччина).

Обстеження проводили до лікування, через 3, 6, 9 та 12 місяців від початку дослідження на тлі антиаритмічної терапії.

На всіх етапах спостереження для оцінки функції ЩЗ використовували такі визначення:

1. Еутиреоз: рівень гормонів ЩЗ у межах нормальних значень (ТТГ – $0,34-5,56$ мкМО/мл, вТ4 – $0,5-1,12$ нг/дл, вТЗ – $2,5-3,9$ пг/мл);

2. Гіпотиреоз: субклінічний гіпотиреоз – при підвищенні рівня ТТГ; маніфестний гіпотиреоз – при підвищенні рівня ТТГ і зниженому вмісті вТ4 і вТЗ);

3. Тиреотоксикоз: знижений рівень ТТГ і підвищений вміст принаймні одного з тиреоїдних гормонів);

4. Еутиреоїдна гіпертироксинемія – лабораторний феномен, який характеризується підви-

щенням рівня вТ4 у сироватці крові при незмінному вмісті ТТГ і вТ3, що відображає пригнічення аміодароном конверсії Т4 в Т3 у периферійних тканинах [9].

Результати дослідження та їх обговорення

При включенні в дослідження у хворих із ФП симптомів гіпо- чи гіпертиреозу не було виявлено, тим не менше структурні зміни ЩЗ зафіксовано в 50,0 % хворих контрольної групи, 48,3 % І групи. Такі ж структурні зміни мала ЩЗ і в половини практично здорових людей. Серед них домінували ознаки ВЗ у 13,3 % осіб та АІТ у 19,0 %. Не було зафіксовано відхилень від норми рівнів гормонів ЩЗ та ТТГ у всіх обстежених хворих. У третини обстежених хворих і здорових були ознаки підвищеного антитілоутворення.

Аналізуючи вплив досліджуваних препаратів на структурно-функціональний стан ЩЗ установлено, що впродовж 12 місяців лікування бісопрололом із дигоксином, не зафіксовано вірогідної зміни частки хворих із клінічними ознаками гіпер- чи гіпотиреозу, тоді як на тлі лікування аміодароном виявлено збільшення кількості хворих зі скаргами, притаманними дисфункції ЩЗ, починаючи з третього місяця лікування.

Через 3 місяці лікування аміодароном скарги на сонливість відмічені в 3 (5,0 %) хворих, закрепи – у 7 (11,7 %), сухість шкіри – у 6 (10,0 %) пацієнтів. У одного хворого зафіксовано ознаки психомоторної загальмованості та мезлякуватість. У подальшому відмічено зростання кількості пацієнтів із скаргами на сонливість до 4 (6,7 %), закрепи до 8 (13,3 %), сухість шкіри до 9 (15,0 %), мезлякуватість до 4 (6,7 %), із ознаками психомоторної загальмованості до 3 (5,0 %) через 12 місяців лікування аміодароном.

Скарги на підвищену пітливість та ознаки емоційної лабільності з'явилися через 6 місяців лікування аміодароном у двох хворих (3,3 %), витрішкуватість, тремор рук та зниження ваги – у одного хворого (1,7 %). У подальшому відбулося зростання частки осіб із вищевказаними скаргами, яка через 12 місяців лікування налічувала 4 (6,7 %) хворих із підвищеною пітливістю та емоційною лабільністю, 2 (3,3 %) – із витрішкуватістю і зниженням ваги, і 3 хворих (5,0 %) – із тре-

мором рук.

До лікування групи були абсолютно ідентичні за структурними змінами ЩЗ – у половини хворих контрольної і І групи не було виявлено змін структури ЩЗ, у 15,0 % хворих – ВЗ, у 20,0 % хворих – ознаки АІТ, у 10,0 % хворих контрольної групи та 6,7 % хворих І групи – поєднання АІТ із ВЗ ($p=0,6365$), а в 5,0 % та 6,7 % хворих, відповідно – дифузне збільшення ЩЗ.

Терапія аміодароном упродовж року характеризувалася тенденцією до зростання частки хворих із структурними змінами ЩЗ, а саме – збільшенням кількості хворих із АІТ на 3,4 % ($p>0,05$), поєднанням ВЗ із АІТ – на 1,7 % ($p>0,05$). Після 12 місяців антиаритмічного лікування дигоксином і бісопрололом виявлено лише зростання частки хворих із АІТ на 5,0 % ($p>0,05$ у порівнянні з даними до лікування). Кількість зафіксованих структурних змін ЩЗ під впливом аміодарону практично ідентичний, викликаним дигоксином і бісопрололом [$OR=0,89$; 95 % CI 0,31-2,51; $p=0,9701$].

Таким чином, серед виявлених структурних змін ЩЗ у хворих представлених груп домінували ознаки аутоімунного тиреоїдиту та вузлового зобу. Антиаритмічне лікування аміодароном упродовж 12 місяців не призвело до структурних змін ЩЗ.

Достовірної відмінності в порівнянні між групами хворих за показниками УЗД ЩЗ до лікування не виявлено. Через 12 місяців лікування у хворих обох груп не виявлено достовірних змін вихідних рівнів сумарного об'єму ЩЗ ($p>0,05$) та розмірів вузлів ЩЗ ($p>0,05$). Достовірних відмінностей показників УЗД ЩЗ після 12 місяців лікування аміодароном у порівнянні з аналогічними показниками хворих, які отримували терапію дигоксином і бісопрололом не виявлено.

На етапі включення в дослідження відхилень від норми рівнів гормонів ЩЗ і ТТГ у всіх обстежених хворих не було виявлено. Між хворими контрольної та І груп достовірної відмінності за рівнями гормонів ЩЗ та ТТГ гіпофіза до лікування також не виявлено.

Функціональний стан ЩЗ досліджували кожних 3 місяці впродовж року.

Таблиця 1
Динаміка тиреоїдного статусу хворих із фібриляцією передсердь під впливом лікування аміодароном на тлі базової терапії впродовж одного року

Часові інтервали, місяці	І група (n=60)				
	Еутиреоз	Гіпотиреоз		Тиреотоксикоз	Еутиреоїдна гіпертироксинемія
		субклінічний	маніфестний		
до лікування	60 (100,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)
3 місяці	53 (88,3)	3 (5,0)	1 (1,7)	0 (0,0)	3 (5,0)
6 місяців	51 (85,0)	3 (5,0)	2 (3,3)	2 (3,3)	2 (3,3)
9 місяців	46 (76,7)	5 (8,3)	4 (6,7)	5 (8,3)	0 (0,0)
12 місяців	40 (66,7)	7 (11,7)	5 (8,3)	8 (13,3)	0 (0,0)

Примітки: 1. n – абсолютна кількість хворих. 2. У дужках – відсоток загальної кількості осіб у групі.

Оцінка функціонального стану ЩЗ через 12 місяців лікування аміодароном показала зростання кількості хворих з гіпертиреозом до 8 (13,3 %), причому перші випадки гіперфункції ЩЗ були

виявлені не раніше, ніж через півроку (табл.1). У цих хворих рівень ТТГ був на 97,3 % ($p<0,0001$) нижчими, вТ₃ на 43,3 % ($p<0,0001$) вищими, а вТ₄ втричі вищими від значень до лікування

($p < 0,0001$). За даними Н. М. Платонової [9], у хворих із АМІТ рівні $вТ_3$ можуть бути незначно підвищеними або нормальними. Таким чином, для верифікації діагнозу АМІТ достатнім буде виявлення знижених рівнів ТТГ та підвищення $вТ_4$.

Також виявлено розвиток гіпотиреозу у 12 (20,0%) хворих, із них у 7 (11,7 %) був субклініч-

ний гіпотиреоз і в 5 (8,3 %) – клінічний варіант. Середній рівень ТТГ в цих хворих був практично в 4 рази вищим у порівнянні з даними до лікування ($p < 0,0001$). Значення $вТ_3$ у хворих із маніфестним гіпотиреозом було вірогідно нижчим на 26,8 % ($p = 0,0009$), а $вТ_4$ на 40,8 % ($p < 0,0001$) у порівнянні з рівнем до лікування (табл.2).

Таблиця 2.
Динаміка рівнів вільних трийодтироніну (пг/мл), тироксину (нг/дл), тиреотропного гормону (мкМО/мл) у хворих із фібриляцією передсердь при прийомі аміодарону впродовж 12 місяців ($M \pm m$)

Показ-ник	До лікування	Через 12 місяців лікування			
		Еутиреоз	Гіпотиреоз		Тиреотоксикоз
			субклінічний	маніфестний	
ТТГ	2,25±0,44	2,22±0,82	7,14±1,44*	8,98±0,66*	0,06±0,01*
$вТ_3$	3,04±0,09	3,18±0,11	2,71±0,52	2,18±0,21*	4,27±0,52*
$вТ_4$	0,76±0,07	0,94±0,09	0,91±0,03	0,48±0,05	2,64±0,09*

Примітки: 1. * – достовірність різниці даних у порівнянні з величинами до лікування ($p < 0,0001$).

Тиреотоксикоз розвинувся у 8 (13,3 %) хворих..

Отже, як видно з табл. 1, на тлі одного року терапії аміодароном 66,7 % хворих залишилися в стані еутиреозу з середніми значеннями рівнів ТТГ ($p = 0,8052$), $вТ_3$ ($p = 0,1272$) і $вТ_4$ ($p = 0,0920$), які достовірно не відрізнялися від значень до лікування, як і впродовж 12 місяців лікування (табл. 2). Однак, у хворих із еутиреозом І групи відмічена тенденція до вищих рівнів $вТ_4$ протягом лікування у порівнянні з показниками у хворих контрольної групи. Також виявлено тенденцію до незначного підвищення рівнів ТТГ та зниження $вТ_3$ упродовж перших 3 місяців лікування аміодароном, що не було характерним для хворих групи дигоксину з бісопрололом. У літературних джерелах це пов'язують із тим, що надмірна кількість йодиду, яка вивільняється при метаболізмі аміодарону, призводить до адаптивної блокади захоплення йоду ЩЗ і синтезу тиреоїдних гормонів (ефект Вольфа-Чайкова). Це характерно для перших тижнів лікування, а потім ЩЗ відновлює свою функцію, і більшість пацієнтів залишаються клінічно в стані еутиреозу [12]. Підвищення рівнів $вТ_4$ пов'язане з блокадою активності ферменту 5'-монодіїодинази І (у ЩЗ та печінці) та ІІ (у гіпофізі) типів, які каталізують конверсію $вТ_4$ у $вТ_3$ [9]. Таким чином, функціональні тести, які оцінюють стан ЩЗ у хворих, котрі приймають аміодарон, мають інший діапазон нормальних значень, ніж у еутиреоїдних осіб, котрі його не приймають.

У хворих контрольної групи, котрі приймали в якості антиаритмічних середників дигоксин і бісопролол, упродовж 12 місяців не виявлено порушень функціонального стану ЩЗ.

У групі бісопрололу з дигоксином, через 12 місяців лікування не зафіксовано вірогідних змін рівнів АТ-ТПО, які становили ($258,54 \pm 20,15$) МО/мл, проти ($242,32 \pm 21,05$) МО/мл до лікування, у той час як під впливом лікування аміодароном мала місце тенденція до зростання частки хворих із підвищеними рівнями АТ-ТПО.

Висновки

1. Функціональні тести, які оцінюють стан ЩЗ у пацієнтів, котрі приймають аміодарон, мають інший діапазон нормальних значень, ніж в еутиреоїдних осіб, без лікування аміодароном: під впливом аміодарону в перші місяці лікування сироваткові рівні вільного тироксину можуть підвищуватись, а вільного трийодтироніну знижуватись, можлива тенденція до незначного підвищення рівнів тиреотропного гормону в перші тижні лікування. Вищезгадані зміни лабораторних показників мають транзиторийний характер і не супроводжуються погіршенням антиаритмічних властивостей аміодарону.

2. Аміодарон у хворих із фібриляцією передсердь ішемічного генезу призводить до розвитку дисфункції щитоподібної залози в 33,3 % пацієнтів

3. Через один рік застосування, гіпотиреоз діагностовано у 20,0 % випадків, у тому числі субклінічний в 11,7 %, та тиреотоксикоз в 13,3 % хворих.

Практичні рекомендації

Усім хворим із фібриляцією передсердь ішемічного генезу перед призначенням аміодарону необхідно проводити УЗД щитоподібної залози, визначати рівні тиреотропного гормону, вільного тироксину та антитіл до тиреопероксидази.

Контроль функціонального стану ЩЗ на тлі лікування аміодароном слід здійснювати визначенням рівнів тиреотропного гормону 1 раз у 6 місяців. У випадку змін рівнів тиреотропного гормону для деталізації характеру патологічних відхилень рекомендоване УЗД ЩЗ, визначення вмісту вільного тироксину і АТ-ТПО у крові.

Література

1. Botsiurko VI, Tymkiv IS, Skrypnyk NV. Problema yodnoho defitsytu ta yoho podolannya na Prykarpatti [The problem of iodine deficiency and its overcoming in the Carpathians]. Problemy endokrynnoi patologii. 2006; 3:S.84 – 87. (Ukrainian).
2. Ermolayeva AS, Byakina OA, Sych YuP, Kopylov FYu, Fadeyev VV. Amiodaron-indutsirovanny tyeotoksikoz 2-go tipa: prediktory i varyanty terapii [Amiodarone-induced thyrotoxicosis type 2: predictors and treatment options]. Almanakh klinicheskoy

- meditsyny. 2019; 47 (2): 156–165. doi: 10.18786/2072-0505-2019-47-018. (Russian).
3. Fibrilatsiia peredserd. Adaptovana klinichna nastanova, zasnovana na dokazakh [Atrial fibrillation. Adapted evidence-based clinical guideline]. – Derzhavnyi ekspertnyi tsentr Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy, Asotsiatsiia kardiologiv Ukrainy, Asotsiatsiia arytmolohiv Ukrainy, Ukrainka asotsiatsiia simeinoi medytyny. Kyiv, 2016. 256p. (Ukrainian).
 4. Gilyarov MYu. Sulimov VA. Amiodaron kak sredstvo neotlozhnogo lecheniya narusheniya ritma serdtsa [Amiodarone as a means of urgent treatment of cardiac arrhythmias]. Russkiy meditsinskiy zhurnal. 2009; T.17. №8: S.54 – 57.(Russian).
 5. Kinoshita S, Hayashi T, Wada K. Risk factors for amiodarone-induced thyroid dysfunction in Japan. J Arrhythm. 2016; 32 (6): 474–480. DOI: 10.1016/j.joa.2016.03.008
 6. Larin OS, Pankiv VI, Selivanenko MI, Hrachova OO. Analiz dialnosti endokrynologichnoi sluzhby Ukrainy u 2010 rotsi ta perspektyvy rozvytku medychnoi dopomohy khvorym z endokrynnoi patolohiieiu [Analysis of the activities of the endocrinology service of Ukraine in 2010 and prospects for the development of medical care for patients with endocrine pathology]. Mizhnarodnyi endokrynologichnyi zhurnal. 2011; 3 (35):11–15. (Ukrainian)
 7. Maslova NP. Ob effektivnosti i bezopasnosti primeneniya amiodarona dlya profilaktiki vnezapnoy smerti u bolnykh IBS [On the efficacy and safety of amiodarone for the prevention of sudden death in patients with coronary heart disease]. Neotlozhnaya terapiya. 2004; 3-4: 35-37. (Russian).
 8. Petunina NA. Osobennosti terapii zabolevaniy shchitovidnoy zhelezy u patsiyentov s kardialnoy patologiyei [Features of therapy of thyroid diseases in patients with cardiac pathology]. Russkiy meditsinskiy zhurnal. 2009; 17 (25): 19-23. (Russian).
 9. Platonova NM. Sovremennyye aspekty diagnostiki i lecheniya amiodaron-indutsirovannogo tireotoksikoza [Modern aspects of diagnosis and treatment of amiodarone-induced thyrotoxicosis]. Poliklinika. 2016; 1-2: 45–50. (Russian).
 10. Sviridenko NY, Platonova NM, Molashenko NV. Sostoyaniya, vyzvannyye priyemom amiodarona v praktike kardiologa i endokrinologa [Conditions caused by amiodarone in the practice of a cardiologist and endocrinologist]. Lechashchiy vrach. 2004; 2:58-61. (Russian).
 11. Serdyuk SE, Bakalov SA, Golitsyn SP. Chastota vozniknoveniya i prediktory razvitiya disfunktsiy shchitovidnoy zhelezy, vyzvannykh dlitelnyy priyemom amiodarona [Frequency and predictors of thyroid dysfunction caused by prolonged amiodarone treatment]. Terapevticheskiy arkhiv. 2005;77(10): 33 – 39.(Russian).
 12. Yamato M, Wada K, Fujimoto M. Association between N-desethylamiodarone/amiodarone ratio and amiodarone-induced thyroid dysfunction. Eur J Clin Pharmacol. 2017; 73: 289–296. DOI: 10.1007/s00228-017-2195-5.

Реферат

ЯТРОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ АМИОДАРОНА

Данилюк О.И.

Ключевые слова: щитовидная железа, функциональное состояние, фибрилляция предсердий, амиодарон-индуцированные тиреопатии.

Цель исследования в проведении анализа частоты структурно-функциональных изменений щитовидной железы, которые возникают при регулярном приеме амиодарона больными с фибрилляцией предсердий в течение 12 месяцев. В основе исследования обследование 80 больных (28 женщин и 52 мужчины) на кардиосклероз (диффузный и постинфарктный) с фибрилляцией предсердий и сердечная недостаточность IIA в возрасте (63,5±1,3) года и 15 практически здоровых лиц соответствующего возраста (62,4±2,4) года - мужчин и женщин в аналогичной пропорции. Основным критерием включения было эутиреоидное состояние щитовидной железы до назначения антиаритмической терапии. Для оценки функционального состояния щитовидной железы исследовали содержание в сыворотке крови: свободного тироксина, трийодтиронина, антител к тиреопероксидазе. Обследование проводили до лечения, через 3, 6, 9 и 12 месяцев от начала исследования на фоне антиаритмической терапии. Для диагностики структурных изменений щитовидной железы проводили ультразвуковое исследование. В зависимости от назначенного лечения обследованных больных распределили следующим образом: I группа - больные, которые получали амиодарон в дозе 200 мг в сутки на фоне базовой терапии (n = 60); контрольная группа - больные, которые получали на фоне базовой терапии, как антиаритмические средства, дигоксин и бисопролол (n = 20). Результат. Лечение амиодароном в течение 1 года вызвало дисфункцию щитовидной железы у 33,3% пациентов. Ведущим в структуре амиодарон-ассоциированных дисфункций щитовидной железы является гипотиреоз (20,0%), субклинический в 11,7% больных, Развитие амиодарониндуцированного тиреотоксикоза наблюдалось у 13,3% пациентов, причем первые случаи гиперфункции щитовидной железы были обнаружены не раньше, чем через полгода. Под влиянием амиодарона в первые месяцы лечения сывороточные уровни свободного тироксина могут повышаться, а свободного трийодтиронина снижаться, возможна тенденция к незначительному повышению уровней тиреотропного гормона в первые недели лечения. Вышеупомянутые изменения лабораторных показателей имеют преходящий характер и не сопровождаются ухудшением антиаритмических свойств амиодарона.

Summary

IATROGENIC CHANGES IN THYROID GLAND OF PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION AFTER THERAPY WITH AMIODARON

Danyliuk O.I.

Key words: thyroid gland, functional state, atrial fibrillation, amiodarone-induced thyropathies.

Objective of the study: to analyze the frequency of structural and functional changes in the thyroid gland of the patients with atrial fibrillation who took amiodarone for 12 months on regular basis. The study was based on findings obtained by examining 80 patients (28 women and 52 men) with cardiosclerosis (diffuse and postinfarction), atrial fibrillation and heart failure IIA at the age of 63.5 ± 1.3 years and 15 healthy individuals of the relevant age (62.4 ± 2.4 years) and relevant sex proportions. The main inclusion criterion was the euthyroid state of the thyroid gland before the beginning of antiarrhythmic therapy. To assess the functional state of the thyroid gland, we studied the content of free thyroxine, triiodothyronine, and antibodies to thyroid peroxidase. The examination was carried out before the therapy, and in 3, 6, 9 and 12 months after the beginning of the study during the course of antiarrhythmic therapy. To detect structural changes in the thyroid gland, we used ultrasound scanning. Depending on the prescribed treatment, the participants

were divided into the following groups: group I included the patients who received amiodarone in a dosage of 200 mg per day and basic therapy (n = 60); control group involved the patients who received the basic therapy with antiarrhythmic drugs, digoxin and bisoprolol (n = 20). Results. The therapy with amiodarone for a year resulted in thyroid dysfunction in 33.3% of the patients. Hypothyroidism (20.0%) is leading in the structure of amiodarone-associated thyroid dysfunctions; this condition is subclinically manifested in 11.7% of the patients. The development of amiodarone-induced thyrotoxicosis was observed in 13.3% of the patients, and the first cases of hyperthyroidism were detected not earlier than six months. Under the effect of amiodarone in the first months of the therapy, serum levels of free thyroxine may increase, while free triiodothyronine may decrease, therefore there may be a tendency to slightly increased levels of thyroid-stimulating hormone in the first weeks of the therapy. The above changes in laboratory parameters are transient and are not accompanied by the deterioration of the antiarrhythmic action of amiodarone.

DOI 10.31718/2077-1096.21.1.16

УДК 616.831-009.7-071

Дельва М.Ю., Дельва І.І.

СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ТА КОМОРБІДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦІЄНТІВ З ГОЛОВНИМ БОЛЕМ НАПРУГИ

Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

Вступ. Хронічний головний біль напруги є значною медико-соціальною проблемою. Процеси хронізації головного болю напруги є мультифакторіальними та включають в себе взаємодію різноманітних факторів. *Мета дослідження:* вивчення соціальних, демографічних та коморбідних характеристик у пацієнтів з частим епізодичним головним болем напруги та хронічним головним болем напруги. *Матеріал та методи.* Обстежено 93 пацієнти з частим епізодичним головним болем напруги та 34 пацієнти з хронічним головним болем напруги. *Визначено* стать, вік, родинний стан, рівень освіти, працевлаштованість пацієнтів, тютюнопаління, тривожні та депресивні розлади (за Госпітальною шкалою тривоги та депресії), наявність мігрені, скелетно-м'язового болю (цервікалії, болю в нижній частині спини), артеріальної гіпертензії, цукрового діабету, абдомінального ожиріння, черепно-мозкової травми в анамнезі. *Результати.* У пацієнтів з хронічним головним болем напруги, порівняно з пацієнтами, які мають частий епізодичний головний біль напруги, достовірно частіше ($p < 0,05$) відмічались відсутність родини (47% проти 23%), тютюнопаління (35% проти 16%), тривожні розлади (82% проти 27%), депресивні розлади (79% проти 27%), абдомінальне ожиріння (41% проти 13%), біль в нижній частині спини протягом останнього календарного року (53% проти 22%). *Висновки.* Вчасна ідентифікація та адекватна корекція станів, що піддаються модифікації (тютюнопаління, тривожні та депресивні розлади, абдомінальне ожиріння), а також раціональне лікування епізодів болю в нижній частині спини у пацієнтів з частим епізодичним головним болем напруги може в перспективі зменшувати ризик подальшої хронізації головного болю.

Ключові слова: головний біль напруги, хронізація, фактори ризику.

Зв'язок публікації з плановими науково-дослідними роботами. Дана робота є фрагментом НДР кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою Української медичної стоматологічної академії: «Оптимізація діагностики, прогнозування та профілактики нейропсихологічних розладів при органічних захворюваннях нервової системи», № державної реєстрації: 0120U104165.

Вступ

Головний біль напруги (ГБН) – найбільш частий первинний головний біль (ГБ), що виникає протягом життя людини майже у 80% популяції [1].

Як правило, діагностика ГБН не викликає утруднень та засновується виключно на знанні та правильній інтерпретації клінічних характеристик цього феномену [2]. Згідно міжнародної класифікації ГБ третього перегляду, ГБН поділяється на нечастий епізодичний ГБН (НЕГБН) – при наявності щонайменше 10 епізодів ГБ, що турбують менше одного дня на місяць (менше 12 днів протягом року) та відповідають діагностичним критеріям ГБН; частий епізодичний ГБН (ЧЕГБН) – при наявності щонайменше 10 епізодів ГБ, що турбують від 1 до 14 днів на місяць протягом більш, ніж останніх трьох місяців (не менше 12 та не більше 180 днів протягом року)

та відповідають діагностичним критеріям ГБН; хронічний ГБН (ХГБН) – напади ГБ турбують не рідше 15 днів на місяць протягом останніх не менш, ніж трьох місяців (не менше 180 днів протягом року) та відповідають діагностичним критеріям ГБН [2].

У переважній більшості випадків ХГБН виникає шляхом трансформації епізодичного ГБН (ЕГБН) [3]. В сучасному суспільстві ХГБН являє собою виражену медико-соціальну проблему, бо супроводжується значними прямими і прихованими економічними тратами, має негативний вплив на процеси соціалізації пацієнтів, значно знижує показники якості їх життя [4, 5]. Однак дотепер залишаються не до кінця розкритими механізми трансформації ЕГБН в ХГБН [6]. Вважається, що процеси хронізації ГБН є мультифакторіальними та включають в себе комплексну